○オオバナタチツボスミレ（浅井康宏）Yasuhiro ASAI: On *Viola grypoceras* A. Gray form. *macrantha* Asai. f. nov.

タチツボスミレ *Viola grypoceras* A. Gray は周知の如く，北は北海道より南は奄美諸島に至る各地に広く分布し，極めて変化に富んだ多年草であって，現在までに，その花や葉の色彩，毛の有無などによって多数の変種並びに品種が区別，報告されている。筆者も従来，本種の変化について種々の観点から注意してきたのであるが，ここに常品に比べて花の大形の一品を記載しておきたい。

本品は花部や，その他の形態などは，何ら母種と異っていないが，しかし図に示す如く花が約2倍大に大きく，一寸美事なもので，しばしば母種と混じて生じている。これをオオバナタチツボスミレと新称する。　（東京歯科大学）



Flowers of *Viola grypoceras* A Gray.
Left: a typical form (f. *grypoceras*) and Right: a larger form (f. *macrantha* Asai).

Viola grypoceras A. Gray form. **macrantha** Asai, f. nova　Differt a *Viola grypoceri* flores majore; petala ca. 17 mm. longa, calcare ca. 10—12 mm. longum.

Nom. Jap. Ohbana-tachitsubo-sumire (nov.).

Hab. On grassy field under the deciduous forest, circa lake Yamanaka-ko, Prov. Kai, central Honshu (Y. Asai, May 3, 1966—Type in TI.).